

VERDERON COMUN

MUTACION LUTINO

CARACTERISTICAS DEL MACHO

PICO Color carne.

OJOS Rojos.

CABEZA
ESPALDA
GARGANTA
PECHO Y
FLANCOS

Amarillo.

VIENTRE Blanco amarillento.

ALAS

Pequeñas coberteras: Amarillas.
Medianas coberteras: Amarillas.
Grandes coberteras: Amarillas.
Remiges secundarias: Amarillas.
Remiges primarias: Amarillas con los bordes externos
Amarillos dorados o con DORE.

OBISPILLO Amarillo dorado o con DORÉ.

COLA Amarilla con la orilla externa amarillo dorado o DORE.

PATAS Y
DEDOS

Color carne.

UÑAS Color carne.

OBSERVACIONES.

1°. EN LA CLASE A, LAS REMIGES Y LAS RECTRICES PUEDEN SER MAS BLANCAS.

2° EN LOS MACHOS NEVADOS O SCHIMMEL PRESENTAN UN REFLEJO BLANCUZCO SOBRE LAS MEJILLAS, LA ESPALDA, LOS FLANCOS Y EL PECHO.

COMPORTAMIENTO HEREDITARIO

RECESIVO Y LIGADO AL SEXO.

Tanto en el macho como en la hembra.

DEFECTOS CLÁSICOS DE LOS MACHOS LUTINOS.

Pigmentación isabela sobre la espalda, en las remiges y las rectrices.
Exceso de nevadura o Schimmel corrido hacia el cuello.

DEFECTOS CLASICOS DE LAS HEMBRAS

Pigmentación isabela visible sobre la espalda, remiges y rectrices.
Color irregular.


Diámetro de la anilla: 3,02 mm



VERDERON COMUN

MUTACION LUTINO

CARACTERISTICAS DE LA HEMBRA



| | |
|------------------|---|
| PICO | De color carne |
| OJOS | Rojos. |
| CABEZA | |
| ESPALDA | |
| GARGANTA | |
| PECHO Y | |
| FLANCOS | Blanco amarillento. |
| VIENTRE | Blancuzco. |
| ALAS | Pequeñas coberteras: Blancuzcas. Medianas coberteras: Blancuzcas. Grandes coberteras: Amarillo blancuzcas. Remiges secundarias: Blancuzcas. Remiges primarias: Blancuzcas con una pequeña orilla amarillenta. |
| ESPALDA | Amarillas. |
| OBISPILLO | Amarillo. |
| COLA | Blancuzca con un pequeño viso amarillo. |
| PATAS Y | |
| DEDOS | Color carne. |
| UÑAS | Color carne. |

VERDERON COMUN

MUTACION ISABELA SATINE

CARACTERISTICAS DEL MACHO

| | |
|----------------------|---|
| PICO | De color carne. |
| OJOS | Rojos. |
| CABEZA | Corona y mejillas: beige muy claro. El resto de la cabeza es amarilla. |
| ESPALDA | Amarilla, con un reflejo beige muy claro, sin estrías. |
| GARGANTA | Amarilla. |
| PECHO | Amarillo, con un reflejo beige muy claro sobre los lados. |
| FLANCOS | Amarillo, con un reflejo beige muy claro. |
| VIENTRE | Blanco sucio. |
| ALAS | Remiges primarias: Beige, con la orilla externa amarilla y un ribete muy claro beige en la extremidad. Remiges secundarias: beige claro. Grandes y medianas coberteras: beige claro. Pequeñas y medianas coberteras: amarillas |
| OBISPILLO | Amarillo. |
| COLA | Los dos primeros tercios son amarillos y él ultimo tercio es beige sin ribete, exceptuando las dos medianas que no presentan amarillo. |
| PATAS Y DEDOS | De color carne. |
| UÑAS | Color carne. |

OBSERVACIONES

En los adultos, el color de fondo es más amarillo sobre el pecho.

COMPORTAMIENTO HEREDITARIO

Recesivo ligado al sexo, al igual que la hembra.

DEFECTOS CLASICOS DE LOS ISABELAS SATINE MACHOS

beige poco o nada visible en las remiges y en las rectrices.
Reflejo beige claro mal repartido sobre la espalda y los flancos.
No visible el reflejo dorsal.

IAMETRO DE LA ANILLA. 3,02 mm



PICOS
Mayorista de aves

VERDERON COMUN

MUTACION ISABELA SATINE

CARACTERISTICAS DE LA HEMBRA

| | |
|------------------|---|
| PICO | De color carne. |
| OJOS | Rojos. |
| CABEZA | Corona y mejillas: beige muy claro. El resto de la cabeza es amarillo claro. |
| ESPALDA | Amarillo claro con un reflejo beige muy claro, presentando un ligero dibujo de estrías beige. |
| GARGANTA | Amarillo claro. |
| PECHO | Amarillo claro con un reflejo beige muy claro. |
| FLANCOS | Amarillo claro con un reflejo beige muy claro. |
| VIENTRE | Blanco sucio. |
| ALAS | Remiges primarias: beige, con la orilla externa amarilla, presentando un ribete beige muy claro en la extremidad. Remiges secundarias: beige claro. Grandes coberteras: beige claro. Medianas y pequeñas coberteras: amarillas, ribeteadas de beige. |
| OBISPILLO | Amarillo. |
| COLA | Los dos primeros tercios son amarillos y el último tercio es beige sin ribete, exceptuando las dos medianas que no tienen amarillo. |

**PATAS Y
DEDOS**

De color carne.

UÑAS

De color carne.

DEFECTOS CLASICOS DE LA HEMBRA ISABELA SATINE

Dibujo de las estrías dorsales poco visibles.

No visible el beige en las remiges y las rectrices.

Reflejo beige mal repartido sobre la espalda, los flancos y el pecho.

DIAMETRO DE LA ANILLA

G = 3,02 mm.



PICOS
Mayorista de aves

VERDERON COMUN

MUTACION ISABELA

CARACTERISTICAS DEL MACHO

| | |
|----------------------|--|
| PICO | De color carne. |
| OJOS | Bruno fuerte (ojos isabelinos). |
| CABEZA | Corona, mejillas y bigotes del mismo color beige. El resto de la cabeza es amarillenta. |
| ESPALDA | Amarilla con un reflejo beige bien repartido. |
| GARGANTA | Amarilla. |
| PECHO | Amarillo con un reflejo beige. |
| OBSERVACIONES | El reflejo beige es menos visible en los adultos. |
| FLANCOS | Amarillos con reflejos beige. |
| VIENTRE | Amarillo, llegando al blanco sobre la región anal. |
| ALAS | Remiges primarias: Brunas, amarillas en la orilla externa y con un ribete beige en la extremidad. Remiges secundarias: Brunas, con un ribete beige. Cuando el ala esta cerrada el ribete beige solo es visible. Grandes coberteras: Beige. Pequeñas y medianas coberteras: Amarillas. |
| OBISPILLO | Amarillo. |

COLA

Los dos primeros tercios son amarillos y el último tercio es bruno con un ribete beige en la extremidad, excepto en las dos medianas que no tienen amarillo.

**PATAS
DEDOS Y
UÑAS**

De color carne.

DIAMETRO DE LA ANILLA: G 3,02mm.

COMPORTAMIENTO HEREDITARIO

Recesivo y ligado al sexo, igual que la hembra.

**DEFECTOS CLASICOS DE LOS VERDERONES ISABELAS
MACHOS**

Cabeza, flancos y espalda no presentan o tienen muy poco reflejo beige. Un reflejo bruno o gris es penalizable. Remiges y rectrices muy oscuras. Las lamas externas de las remiges y de las rectrices con el amarillo muy pálido.



COS
de aves

VERDERON COMUN

MUTACION ISABELA

CARACTERISTICAS DE LA HEMBRA

| | |
|------------------|--|
| PICO | Color carne. |
| OJOS | Brunos oscuros (color isabelino). |
| CABEZA | Corona, mejillas y bigotes del mismo color beige. El resto de la cabeza es verde amarillento. |
| ESPALDA | Verde amarillento con un reflejo beige bien repartido. |
| GARGANTA | Verde amarillenta. |
| PECHO | Verde amarillento con un reflejo beige. |
| FLANCOS | Verde amarillento con reflejo beige. |
| VIENTRE | beige claro. |
| ALAS | Remiges primarias: Bruno beige, amarillo claro en la orilla externa y con un ribete beige claro en la extremidad. Remiges secundarias: Bruno beige. Grandes coberteras: Bruno beige. Pequeñas y medianas coberteras: Verde amarillentas bañadas de beige. |
| OBISPILLO | Verde amarillento. |
| COLA | Los dos tercios primeros, amarillo pálido, el último tercio bruno, con un ribete beige en la extremidad, excepto las dos medianas que no tienen amarillo. |

**PATAS
DEDOS Y
UÑAS**

Color carne.

OBSERVACIONES


En las hembras adultas el color de fondo amarillo es más visible sobre el pecho.

DEFECTOS CLASICOS DE LAS HEMBRAS ISABELAS

Reflejo bruno o gris es penalizable.

Remiges y rectrices muy oscuras.

Demasiado amarillo en el pecho en la forma adulta.



VERDERON COMUN

MUTACION AGATA

CARACTERISTICAS DEL MACHO

| | |
|----------------------|---|
| PICO | Color carne. |
| OJOS | Negros. |
| CABEZA | Corona, mejillas y bigotes del mismo color gris. El resto de la cabeza es verde amarillento. |
| ESPALDA | Verde con un reflejo gris muy regular. |
| GARGANTA | Verde amarillento. |
| PECHO | Verde amarillento con un ligero reflejo gris. |
| OBSERVACIONES | El reflejo gris es menos visible en los adultos. |
| FLANCOS | Verde amarillento con un reflejo gris. |
| VIENTRE | Verde amarillento. |
| ALAS | Remiges primarias: Gris oscuro, amarillo en la orilla externa y un ribete gris claro en la extremidad. Remiges secundarias: Gris oscuro con un largo ribete gris claro. Cuando el ala esta cerrada solo el ribete gris es visible. Grandes coberteras: Gris plateado. Pequeñas y medianas coberteras: verde amarillento. |
| OBISPILLO | Verde amarillento. |

COLA Los dos tercios primeros son amarillos y el último tercio es gris oscuro con un ribete gris claro, excepto las medianas que no tienen amarillo.

**PATAS
DEDOS Y
UÑAS** De color carne

DIAMETRO DE LA ANILLA: G. 3.02mm.

COMPORTAMIENTO HEREDITARIO
Recesivo y ligado al sexo.

DEFECTOS CLASICOS DEL VERDERON AGATA MACHO

Demasiado amarillo en el pecho.
Cabeza, flancos y espalda falta el reflejo gris.
Remiges y rectrices poco oscuras.
Las lamas externas de las remiges y las rectrices demasiado pálidas.
Falta de bigotes.



PICOS
Mayorista de aves

VERDERON COMUN

MUTACION AGATA

CARACTERISTICAS DE LA HEMBRA

| | |
|-----------------------------------|---|
| PICO | Color carne. |
| OJOS | Negros. |
| CABEZA | Corona, verde amarillenta estriado de gris. Mejillas, verde amarillentas sombreadas de gris. Bigotes grises. |
| ESPALDA | Verde, con un dibujo estriado de color gris bien visible. |
| GARGANTA | Gris claro. |
| PECHO | Gris claro, con un dibujo estriado de color gris sobre los costados. |
| FLANCOS | Gris claro, con un dibujo estriado de color gris. |
| VIENTRE | Gris claro. |
| ALAS | Remiges primarias: Gris oscuro, amarillo claro el largo de la orilla externa y con un ribete gris claro en la extremidad de las remiges. Remiges secundarias: Gris oscuro, con un largo ribete gris bruno. Cuando el ala esta cerrada solo el ribete gris bruno es visible. Grandes coberteras: Gris bruno. Pequeñas y medianas coberteras: Verde bañadas de gris. |
| OBISPILLO | Verde amarillento velado de gris. |
| COLA | Las dos terceras partes primeras son de un color amarillo claro, la última parte es de color gris oscuro con un ribete gris claro, exceptuando las dos medianas que carecen de amarillo. |
| PATAS DEDOS Y UÑAS | De color carne. |

DIAMETRO DE LA ANILLA

G: 3,02mm

OBSERVACIONES

Un poco de bruno puede ser aún visible en las estrías.

La más gris es la mejor.

En las adultas, el color de fondo amarillo es más visible sobre el pecho.

DEFECTOS CLASICOS DE LAS HEMBRAS AGATAS

Demasiado amarillo en el pecho en la clase A.

Poco estriado o nada en la espalda.

Falta de gris en los flancos.

Falta de estrías en los flancos



VERDERON COMUN

MUTACION BRUNA

CARACTERISTICAS DEL MACHO

| | |
|------------------|--|
| PICO | Color carne. |
| OJOS | Brunos. |
| CABEZA | Bruno amarillento con un reflejo gris sobre las mejillas. Dibujo de los bigotes bien visibles y más oscuros que las mejillas. Cejas mas claras. |
| ESPALDA | Bruno amarillento. |
| PECHO | Amarillo bruno (oscuro). |
| FLANCOS | Bruno amarillento. |
| VIENTRE | Amarillento. |
| ALAS | Pequeñas coberteras: Bruno amarillento. Medianas coberteras: Bruno amarillentas. Grandes coberteras: Bruno grisáceo. Remires secundarias: Bruno grisáceo. Remires primarias: Brunas con un ribete beige en la extremidad. La orilla externa es amarilla. |
| OBISPILLO | Verde oliva. |
| COLA | Las dos terceras partes primeras son amarillas y él ultimo tercio es de color bruno con un ribete beige, excepto las dos rectrices medias que son brunas con un ribete beige. |

**PATAS
DEDOS Y
UÑAS**

Color carne.

OBSERVACIONES

1ª Lo más bruno posible.

2ª Los machos adultos tienen el color de fondo amarillo, más visible sobre el pecho.

DEFECTOS CLASICOS DE LOS MACHOS BRUNOS

Demasiado claro.

Demasiado gris en las remiges y las rectrices.

CARÁCTER HEREDITARIO

Tanto en los machos como en las hembras es recesivo y ligado al sexo



VERDERON COMUN

MUTACIÓN BRUNA

CARACTERISTICAS DE LA HEMBRA

| | |
|-----------------------------------|---|
| PICO | Color carne. |
| OJOS | Brunos. |
| CABEZA | Bruno cálido, con los bigotes bien marcados. |
| GARGANTA | Bruno cálido. |
| PECHO | Bruno. |
| FLANCOS | Bruno cálido. |
| VIENTRE | Bruno sucio. |
| ALAS | Pequeñas coberteras: Bruno cálido. Medianas coberteras: Bruno cálido. Grandes coberteras: Brunas con un reflejo gris. Remiges secundarias: Brunas con un reflejo gris. Remiges primarias: Brunas con un ribete beige en la extremidad. Un pequeño ribete amarillo a lo largo de toda la orilla externa. |
| OBISPILLO | Bruno amarillento. |
| COLA | El primer tercio es amarillo y los dos últimos tercios son Brunos con un ribete beige, excepto las dos rectrices medias que son brunas con un ribete beige. |
| PATAS DEDOS Y UÑAS | Color carne. |

OBSERVACIONES

El bruno lo mas fuerte posible.

DEFECTOS DE LAS HEMBRAS VERDON BRUNAS.

El color de fondo amarillo demasiado visible en el pecho.



JILGUERO BLANCO

MUTACIO MASCARA NARANJA

CARACTERISTICAS DEL MACHO Y DE LA HEMBRA

| | |
|----------------------|--|
| PICO | De color carne, ligeramente oscuro en la punta del maxilar superior. |
| OJOS | Negros. |
| CABEZA | Blanca. Mascara naranja que no llega a la base del pico. |
| ESPALDA | Blanca. |
| GARGANTA | Ver mascara, (traducción literal, no encuentro significado, creo que la garganta es blanca y sin mascara). |
| PECHO | Blanco con algunas plumas amarillas. |
| FLANCOS | Blancos. |
| ALAS | Remiges primarias: Blancas, con un ribete amarillo en toda la parte media. Remiges secundarias: Blancas. Coberteras primarias: Blancas con varias plumas amarillas. Coberteras secundarias y terciarias: Blancas. |
| OBISPILLO | Blanco. |
| COLA | Blanca con un ribete amarillo. |
| PATAS Y DEDOS | Color carne. |
| UÑAS | Blancas. |

DEFECTOS CLASICOS DE LOS JILGUEROS MASCARA NARANJA

Mascara interrumpida y poco nítida.
Blanco poco puro.

COMPORTAMIENTO HEREDITARIO

Libre.



JILGUERO

MUTACION PASTEL

CARACTERISTICAS DEL MACHO Y DE LA HEMBRA

Comportamiento hereditario: Recesivo y ligado al sexo.

PICO Color carne.

OJOS Negros.

CABEZA Mascara naranja o roja, con un dibujo gris desde el cráneo a la nuca.
Mejillas: Blanco sucio.

ESPALDA Gris bruno claro.

GARGANTA Blanco sucio bajo la mascara.

PECHO Gris bruno claro, con el champiñón blancuzco.

FLANCOS Gris bruno claro.

ALAS Remiges primarias: Gris oscuro, lo mas igualado posible, con las extremidades blancas.
Remiges secundarias: Gris oscuras, lo mas igualado posible, con las extremidades blancas.
Coberteras: Gris oscuro.
Espejuelo o lunar: Amarillo.

OBISPILLO Gris bruno claro, transformándose en blanco sobre la cola.

COLA Rectrices: Grises con manchas blancas sobre las dos rectrices externas.

**PATAS
DEDOS Y
UÑAS** Color carne.



JILGUERO

MUTACIÓN AGATA

CARACTERISTICAS DEL MACHO

| | |
|----------------------|---|
| PICO | De color carne, con la extremidad llameado en negro. |
| OJOS | Brunos oscuros. |
| CABEZA | Mascara: Rojo escarlata englobando la frente, el mentón y la mitad de las mejillas justo al ojo. Alrededor de la mascara una ancha mancha blanca parte de los lados de la cabeza justo hacia la garganta. Calota y nuca: Negra Loré: Negro. |
| OBSERVACIONES | Las mejillas son blancas pero hay que tener en cuenta las razas o subespecies geográficas. |
| CUELLO | Collar blanco en la nuca separando el negro de la nuca y el gris beige del manto. |
| ESPALDA | Gris beige uniforme |
| HOMBROS | Negros (brunos verduzcos en las hembras). |
| PECHO | Gris beige, con el champiñón blanco en el centro. |
| FLANCOS | Gris beige aclarándose hacia la parte de atrás. |
| VIENTRE | Blanco sucio. |
| ALAS | Negras, con una larga barra alar amarillo vivo. Puntos blancos en la extremidad de cada remige. |
| OBISPILLO | Blancuzco, lavado o velado de gris beige. |

COLA Negras con puntos blancos en la extremidad de las rectrices.
Una gran mancha blanca en la parte inferior de las rectrices externas (habas).

**PATAS Y
DEDOS** De color carne.

UÑAS Oscuras.

CARACTERES HEREDITARIOS

Recesivo y ligado al sexo.



Picos
Mayorista de aves

JILGUERO

MUTACION ISABELA

CARACTERISTICAS DEL MACHO Y DE LA HEMBRA

| | |
|----------------------|---|
| PICO | Color carne. |
| OJOS | Brunos. |
| CABEZA | Mascara naranja roja, englobando la frente, el mentón y la mitad de las mejillas justo al ojo. Alrededor de la mascara una ancha mancha blanca que parte de los lados de la cabeza y va justo a la garganta. Calota y nuca: Bruno beige. Lore: Bruno beige. |
| OBSERVACIONES | Las mejillas son blancas, pero hay que tener en cuenta las razas o subespecies geográficas. |
| CUELLO | Collar blanco en la nuca, separando el bruno beige de la nuca del bruno beige del manto. |
| ESPALDA | Bruno beige uniforme. |
| HOMBROS | Brunos (bruno verduzco en las hembras). |
| PECHO | Bruno beige, con el champiñón blanco en el centro. |
| FLANCOS | Bruno beige aclarándose hacia detrás. |
| VIENTRE | Blanco sucio. |
| ALAS | Bruno beige, con una larga barra alar amarillo vivo. Puntos blancos en la extremidad de cada remige. |
| OBISPILLO | Blancuzco, lavado o teñido de gris. |

COLA

Bruno beige, con puntos blancos en la extremidad de las rectrices. Una gran mancha blanca en la extremidad de las rectrices externas en su parte inferior es visible. (habas).

**PATAS
DEDOS Y
UÑAS**

De color carne.

COMPORTAMIENTO HEREDITARIO.

Recesivo y ligado al sexo.



JILGUERO

MUTACION BRUNA

CARACTERISTICAS DEL MACHO Y DE LA HEMBRA

| | |
|----------------------|---|
| PICO | De color carne. |
| OJOS | Brunos oscuros. |
| CABEZA | Mascara: Naranja-roja que engloba a la frente, el mentón y la mitad de las mejillas, justo al ojo. Alrededor de la mascara una ancha mancha blanca parte de los lados de la cabeza llegando justo a la garganta. Calota y nuca: Bruno oscuro. Loré: Bruno oscuro. |
| OBSERVACIONES | Las mejillas son blancas pero hay que tener en cuenta las razas o subespecies geográficas. |
| CUELLO | Collar blanco en la nuca separando el bruno de la nuca del bruno del manto. |
| ESPALDA | Bruno cálido uniforme. |
| HOMBROS | Bruno oscuro (bruno verdoso en las hembras) |
| PECHO | Bruno cálido, con el champiñón blanco en el centro. |
| FLANCOS | Brunos aclarándose hacia detrás. |
| VIENTRE | Blanco sucio. |
| ALAS | Bruno oscuro, con una larga barra alar amarillo vivo. Puntos blancos en la extremidad de cada remige. |
| OBISPILLO | Blancuzco teñido de bruno. |

COLA

Bruno oscuro con puntos blancos en la extremidad de las rectrices.
Una gran mancha blanca en la parte inferior de las rectrices externas es visible. (Habas).

**PATAS
DEDOS Y
UÑAS**

De color carne.

COMPORTAMIENTO HEREDITARIO

Recesivo y ligado al sexo.



PINZON COMUN

MUTACION OPAL

CARACTERISTICAS DEL MACHO

| | |
|----------------------|---|
| PICO | En verano: Gris oscuro azulado. En invierno: Gris oscuro. |
| OJOS | Brunos oscuros. |
| CABEZA | Frente negra. Corona, occipucio y nuca, gris oscuro azulado. Mejillas, loré, región auricular, mentón y cejas: De color vino amarillento. |
| ESPALDA | Amarillo verdoso con reflejos azulados. |
| HOMBROS | Gris oscuro azulado. |
| PECHO | Color vino muy claro, con un reflejo gris claro azulado. |
| OBSERVACIONES | El color del pecho puede ser más pálido. |
| GARGANTA | Color vino muy claro, con un reflejo gris claro azulado. |
| FLANCOS | Color vino muy claro, con un reflejo gris claro azulado. |
| VIENTRE | Región anal blanco sucio. |
| ALAS | Remiges primarias: Gris azul. Remiges secundarias: Gris azul, con un ribete amarillento en la parte inferior de las remiges. Sobre las alas (hombros): Blancos. Barra alar : amarillo verdoso y un pequeño espejuelo o lunar blanco. |
| OBISPILLO | Amarillo verdoso. |

COLA Rectrices: Gris azulado enteramente ribeteadas de amarillo verdoso a lo largo de la orilla externa.
Las rectrices externas tienen una gran mancha blanca en la parte inferior.

PATAS Y DEDOS Color carne oscuro.

UÑAS Oscuras.

COMPORTAMIENTO HEREDITARIO

Recesivo y autosómico en ambos sexos.



PINZON COMUN

MUTACION OPAL

CARACTERISTICAS DE LA HEMBRA

| | |
|----------------------|--|
| PICO | Color carne oscura ligeramente llameado de gris. |
| OJOS | Brunos oscuros. |
| CABEZA | Gris claro azulado, con dos líneas más oscuras encima del vertex descendiendo hacia la nuca. |
| ESPALDA | Amarillo verdoso con un reflejo azulado. |
| HOMBROS | Gris claro azulado. |
| PECHO | Gris claro lavado de amarillo. |
| GARGANTA | Gris claro lavado de amarillo. |
| FLANCOS | Gris claro lavado de amarillo. |
| VIENTRE | Región anal: Gris blanco sucio. |
| ALAS | Como el macho, pero de un gris azulado más pálido. |
| OBISPILLO | Amarillo verdoso. |
| COLA | Como el macho pero de un gris azulado mas claro. |
| PATAS Y DEDOS | Color carne oscuro. |
| UÑAS | Oscuras. |

PINZON COMUN

MUTACION AGATA

CARACTERISTICAS DEL MACHO

| | |
|----------------------|---|
| PICO | En verano azul acero. En invierno gris con la punta más oscura. |
| OJOS | Brunos oscuros. |
| CABEZA | Frente negra. Corona, occipucio y nuca: Gris azulado. Mejillas, lore, región auricular, mentón y cejas: Rosa bruno. |
| ESPALDA | Gris brunáceo. |
| PECHO | Rosa bruno. |
| HOMBROS | Gris azul. |
| GARGANTA | Rosa bruno. |
| FLANCOS | Rosa bruno. |
| OBSERVACIONES | El primer año el color del pecho, de los flancos puede ser más pálido. |
| VIENTRE | Región anal blanca. |
| ALAS | Remiges primarias: De color negro. Remiges secundarias: De color negro, con un ribete amarillento en la parte inferior. Sobre las caudales (hombros). Barra alar blanca con un pequeño espejuelo o lunar blanco. |

- OBISPILLO** Verde oliva lavado de amarillo.
- COLA** Rectrices: Negras, enteramente ribeteadas de verde a todo lo largo de la orilla externa.
Las rectrices externas tienen una gran mancha blanca en la parte inferior.
- PATAS Y DEDOS** Color carne oscuro.
- UÑAS** Oscuras.
- CARÁCTER HEREDITARIO**
Recesivo y ligado al sexo en ambos sexos.



PICOS
Mayorista de aves

PINZON COMUN

MUTACION AGATA

CARACTERISTICAS DE LA HEMBRA

| | |
|------------------|---|
| PICO | Color carne, ligeramente flameado de gris. |
| OJOS | Brunos oscuros. |
| CABEZA | Gris bruno claro con dos rayas gris oscuras sobre la parte alta del cráneo que descienden hacia la nuca. |
| ESPALDA | Gris claro. |
| HOMBROS | Gris claro. |
| PECHO | Gris claro. |
| GARGANTA | Gris claro. |
| FLANCOS | Gris claro. |
| VIENTRE | Región anal: Gris, blanco sucio. |
| ALAS | Remiges primarias: Negras. Remiges secundarias: De color negro, con un ribete amarillento en la parte inferior. Sobre las alas (hombros): Blancos. Barra alar: Menos blanca que el macho o blanco sucio y un pequeño espejuelo o lunar blanco. |
| OBISPILLO | Verde, lavada de amarillo. |
| COLA | Rectrices: Negras, enteramente ribeteadas de verde a todo lo largo de la orilla externa. Las rectrices externas tienen una gran mancha blanca en la parte inferior. |

**PATAS Y
DEDOS**

Color carne oscura.

UÑAS

Oscuras.



PARDILLO SICERIN

MUTACION BRUNO PASTEL

CARACTERISTICAS DEL MACHO

| | |
|-----------------------------------|--|
| PICO | Amarillo. |
| OJOS | Negros bruno. |
| CABEZA | Calota roja. Frente bruno claro. Mejillas brunas. Nuca: Bruna con ligeras estrías más brunas. |
| ESPALDA | Color bruno con las estrías brunas más oscuras. |
| GARGANTA | Babero grisáceo. |
| PECHO | Bruno sin estrías visibles. |
| FLANCOS | Brunos, con estrías ligeramente visibles. |
| VIENTRE | Blanco sucio. |
| ALAS | Remiges primarias: Gris beige con ribetes brunos claros. Remiges secundarias: Gris beige con ribetes brunos muy visibles. Coberteras: Gris beige, con un ribete bruno muy visible. |
| OBISPILLO | Gris beige con ribetes brunos. |
| COLA | Gris beige con ribetes brunos. |
| PATAS DEDOS Y UÑAS | Color carne. |

PARDILLO SICERIN

MUTACION BRUNO PASTEL

CARACTERISTICAS DE LA HEMBRA

| | |
|--------------------------------|---|
| PICO | Amarillo. |
| OJOS | Negros brunos. |
| CABEZA | Calota: Roja. Frente: Bruno claro. Mejillas: Bruno claro. Nuca: Bruno claro, con estrías brunas. |
| ESPALDA | Bruno claro con estrías brunas. |
| GARGANTA | Babero grisáceo. |
| PECHO | Bruno sin estrías visibles. |
| FLANCOS | Brunos sin estrías visibles. |
| VIENTRE | Blanco sucio. |
| ALAS | Remiges primarias: Gris beige con ribetes brunos claros. Remires secundarias: Gris beige con ribetes brunos muy visibles. Coberteras: Gris beige con ribetes brunos muy visibles, (tipo Phaeo). |
| OBISPILLO | Gris beige con ribetes brunos. |
| COLA | Gris beige, con ribetes brunos claros. |
| PATAS, DEDOS Y UÑAS | De color carne. |

PARDILLO SICERIN


MUTACION PASTEL

CARACTERISTICAS DEL MACHO Y DE LA HEMBRA

| | |
|----------------------|---|
| PICO | Amarillo, extremo de la mandíbula superior bruno. |
| OJOS | Negros. |
| CABEZA | Bruna estriada de bruno oscuro. Mejillas: Brunas con la región auricular bruna oscura. |
| ESPALDA | Bruno estriada de bruno oscuro (pigmento fuerte). |
| GARGANTA | Babero grisáceo. |
| PECHO | Bruno cálido. |
| FLANCOS | Bruno, estriado de bruno más oscuro. |
| ALAS | Remiges primarias y secundarias: Bruno oscuro con un ribete beige. Coberteras: Brunas, con un ribete bruno bermellón. Barra alar: Bruno beige bien visible. |
| OBISPILLO | Beige claro, estriado de bruno oscuro. |
| COLA | Bruna con ribetes beige. |
| PATAS Y DEDOS | Color carne fuerte. |
| UÑAS | Negras. |

COMPORTAMIENTO HEREDITARIO

Recesivo y ligado al sexo.



DEFECTOS CLASICOS DEL SICERIN PASTEL

Demasiado gris en las remiges-coberteras-cola.
Flancos demasiado claros.
Babero demasiado claro.



PARDILLO SICERIN

MUTACION ISABELA

CARACTERISTICAS DEL MACHO Y DE LA HEMBRA

| | |
|------------------|--|
| PICO | Amarillento con la mandíbula superior llameada. |
| OJOS | Brunos oscuros. |
| CABEZA | Frente: Beige. La mitad del vértice craneal es rojo rosa, pero puede estar reemplazado por un amarillo bruno, La perdida del color rojo no es penalizable. Trazos encima de las cejas: Beige. Mejillas y región auricular: Tienen un color beige, lavado de rosa. Lore: Beige. |
| ESPALDA | Beige claro con estrías bruno clara que deben ser visibles. |
| GARGANTA | Pequeño babero bruno claro, ligeramente visible. La garganta es beige claro. |
| PECHO | Beige claro con estrías bruno claras arriba del pecho. En los machos adultos, el pecho puede ser rosa. |
| FLANCOS | Color de fondo beige claro, estriado de bruno claro. Las estrías parten desde lo alto del pecho y descendiendo a lo largo de los flancos. |
| VIENTRE | Blanco sucio. |
| ALAS | Remiges primarias: Beige claro. Remiges secundarias: Bruno claro. Coberteras: Bruno claro con las extremidades beige claro que forman las bandas alares. |
| OBISPILLO | Beige claro estriado de bruno claro. Puede estar bañado de rosa en el macho. |
| COLA | Las rectrices son beige claro con un ribete mas claro muy poco visibles. |

**PATAS
DEDOS Y
UÑAS**

De color carne.

OBSERVACIONES


En ligero reflejo rosa puede ser visible sobre el pecho y en los flancos, en los machos jóvenes el menos rosa es el mejor.

Defectos clásicos de los sicerines isabelas machos y hembras

Estrías poco visibles sobre la espalda y los flancos.

Pico naranja o rojo.

Reflejo bruno sobre la espalda.



LUGANO

MUTACION AGATA DILUIDO

CARACTERISTICAS DEL MACHO

| | |
|----------------------|---|
| PICO | De color carne encendido o más fuerte en la parte superior. |
| OJOS | Negros. |
| CABEZA | Calota: Gris oscuro. Trazos sobre las cejas: Amarillo. Mejillas: Amarillo verdoso bien dibujadas de gris oscuro. Ligera decoloración es normal alrededor del pico. |
| ESPALDA | Verde amarillento con estrías gris oscuras. |
| GARGANTA | Puede presentar un babero gris oscuro o no tener babero. |
| PECHO | Amarillo verdoso velado de gris. |
| FLANCOS | Amarillento, mas claro que el pecho con un dibujo estriado gris oscuro. |
| ALAS | Grandes remiges: Gris oscuro con un ribete amarillo a lo largo de la orilla externa. Remiges secundarias: Gris oscura con un ribete amarillo en la extremidad. Coberteras: Gris oscuras. Una barra alar amarilla debe de ser bien visible. |
| OBISPILLO | Amarillo. |
| COLA | Gris oscura en la parte superior de las rectrices. En la parte inferior de las rectrices las dos primeras partes son amarillas y el último tercio es de color gris oscuro. |
| PATAS Y DEDOS | De color carne. |
| UÑAS | De color corneo. |

PICOS
Mayorista de aves

DEFECTOS DE LOS LUGANOS AGATAS DILUIDOS MACHOS

Falto o poco dibujo dorsal.

Estrías poco definidas.

Estrías de la cabeza, espalda, flancos, alas, cola poco igualadas.

COMPORTAMIENTO HEREDITARIO

El ágata recesivo y ligado al sexo.

La dilución: Dominante simple factor.



LUGANO

MUTACION AGATA DILUIDO

CARACTERISTICAS DE LA HEMBRA

| | |
|----------------------|---|
| PICO | De color carne, fuerte o encendido en la parte superior. |
| OJOS | Negros. |
| CABEZA | Calota: Amarillo verdoso claro, estriado de gris oscuro. Mejillas: Amarillo verdoso bañado de gris. |
| ESPALDA | Verde amarillento pálido, estriado de gris oscuro. Las estrías dorsales deben de ser bien visibles. |
| GARGANTA | Grisácea. |
| PECHO | Grisáceo con un ligero dibujo estriado de gris oscuro. |
| FLANCOS | Grisáceos muy claros y estriado de gris oscuro. |
| ALAS | Grandes remiges: Gris oscuro con un ribete amarillo a lo largo de la orilla externa. Remiges secundarias: Gris oscuro con un ribete amarillo en la extremidad. Una barra alar amarillenta es visible. |
| OBISPILLO | Amarillento. |
| COLA | Gris oscuro en la parte superior de las rectrices. En la parte inferior de las rectrices el primer tercio es amarillento y los dos últimos tercios son gris oscuro. |
| PATAS Y DEDOS | De color carne. |
| UÑAS | De color corneo. |

FALTAS TÍPICAS DEL LUGANO HEMBRA AGATA DILUIDO

Demasiado amarillo en el pecho.

Falta de estrías dorsales.

Color de fondo amarillo poco intenso en la espalda.



LUGANO

MUTACION ISABELA

CARACTERISTICAS DEL MACHO

| | |
|-----------------------------------|---|
| PICO | Color carne, llameado u oscuro en la extremidad de la mandíbula superior. |
| OJOS | Brunos. |
| CABEZA | Vertex y occipucio: Bruno claro. Trazos oculares: Amarillos. Mejillas: Bruno claro lavadas o teñidas de amarillo. |
| ESPALDA | Manto: Bruno claro muy ligeramente estriado. |
| GARGANTA | Amarillo, con un babero bruno claro, el babero tiene que estar presente. |
| PECHO | Amarillo. |
| FLANCOS | Amarillento, con estrías bruno claro. |
| VIENTRE | Blanco sucio. |
| ALAS | Pequeñas coberteras: Bruno claro. Coberteras medianas: Bruno claro con un ribete amarillo el cual forma la banda alar. Grandes coberteras: Bruno claro con un ribete amarillo. Bandas alares y espejuelos: Amarillo. |
| OBISPILLO | Amarillo. |
| COLA | Los dos primeros tercios de las rectrices son amarillas y él ultimo tercio es de color bruno claro, salvo las dos rectrices medianas que son enteramente brunas. |
| PATAS DEDOS Y UÑAS | De color carne. |

DEFECTOS CLASICOS DEL MACHO LUGANO ISABELA

Anteojos irregulares.

Trazos de las cejas que están delante del ojo.

Dibujos de los flancos irregulares.

Sin estrías dorsales.

Frente muy pálida.

Reflejos grises.



PICOS
Lista de aves

LUGANO

MUTACION ISABELA

CARACTERISTICAS DE LA HEMBRA

| | |
|-----------------------------------|--|
| PICO | Color carne, llameado de bruno en la extremidad de la mandíbula superior. |
| OJOS | Brunos. |
| CABEZA | Frente: Vertex y occipucio blanco sucio, lavado de amarillo y estriado de bruno claro |
| ESPALDA | Manto: Blanco sucio lavado de amarillo y estriado de bruno claro. |
| GARGANTA | Blanco sucio. |
| PECHO | Blanco sucio lavado de amarillo pálido (La mas blanca es la mejor), con un dibujo estriado de bruno claro sobre lo alto del pecho. |
| FLANCOS | Blanco sucio, estriado de bruno claro. |
| VIENTRE | Blanco sucio |
| ALAS | De color idéntico a las alas de los machos, pero el amarillo es menos intenso. |
| OBISPILLO | Blanco sucio lavado de amarillo. |
| COLA | El primer tercio de las rectrices es amarillo y los dos últimos tercios son brunos claro, salvo las dos rectrices medias que son enteramente brunas. |
| PATAS DEDOS Y UÑAS | De color carne. |

DEFECTOS CLASICOS DE LA HEMBRA LUGANO ISABELA

Demasiado amarillo en el pecho.
Anteojos blancos.
Dibujos de los flancos irregulares.
Falta de estrías dorsales.
Frente demasiado clara.
Reflejos grises.

COMPORTAMIENTO HEREDITARIO.

Recesivo y ligado al sexo. Esto es para los dos sexos.



PICOS
Mayorista de aves

LUGANO

MUTACION ISABELA DILUIDO

CARACTERISTICAS DEL MACHO

| | |
|-----------------------------------|--|
| PICO | Color carne, bruno fuerte en el extremo del maxilar superior. |
| OJOS | Brunos. |
| CABEZA | Vertex y occipucio: Amarillo, velado de bruno. Mejillas: Amarillas, veladas de beige. Trazos encima de las cejas: Amarillos, pocos visibles. |
| ESPALDA | Manto: Amarillo, lavado de beige sin estrías. |
| GARGANTA | Amarillo, lavada de beige. |
| FLANCOS | Amarillo, ligeramente estriada de beige. |
| VIENTRE | Blanco sucio. |
| ALAS | Coberteras: Amarillas, con ribetes y extremidades beige claro. Barra alar visible. Remiges: Beige claro con ribetes amarillos. |
| OBISPILLO | Amarillo lavado de beige. |
| COLA | Los dos primeros tercios de las rectrices son amarillas y el último tercio es beige claro, salvo las dos rectrices medias que son enteramente beige. |
| PATAS DEDOS Y UÑAS | De color carne. |

DEFECTOS CLASICOS DE LOS MACHOS

Demasiado blanco en la Frente.
Flancos muy claros.
Barra alar poco visibles.
Color de fondo amarillo mal repartido.

COMPORTAMIENTO HEREDITARIO.

El isabela: Recessivo y ligado el sexo.

La dilución: Dominante, simple factor.



LUGANO

MUTACION ISABELA DILUIDO

CARACTERISTICAS DE LA HEMBRA.

| | |
|-----------------------------------|---|
| PICO | Color carne, encendido en la punta de la mandíbula superior. |
| OJOS | Oscuros. |
| CABEZA | Frente: Vertex y occipucio; beige claro lavada de amarillo. Trazos encima de la ceja: Amarillo claro. |
| ESPALDA | Manto: Amarillo, lavado de beige y ligeramente estriado. |
| GARGANTA | Blanco sucio, con lo menos amarillo posible. |
| PECHO | Blanco sucio, con el menos amarillo posible. |
| FLANCOS | Blanco sucio, estriado de beige claro. |
| VIENTRE | Blanco sucio. |
| ALAS | Coberteras: Amarillas con ribete y la extremidad beige. Barra alar: Visible. Remires: Beige, con un ribete amarillo. |
| OBISPILLO | Amarillo velado de beige claro. |
| COLA | El primer tercio de las rectrices es amarillo y los dos tercios últimos son de color beige, Salvo las dos rectrices medianas que son enteramente beige. |
| PATAS DEDOS Y UÑAS | De color carne. |

CARACTERISTICAS DE LAS HEMBRAS ISABELA DILUIDO

Demasiado claro en la frente.
Dibujos de los flancos insuficientes.
Barra alar no visible.



COS
de aves

CAMACHUELO COMUN

MUTACION BRUNA

CARACTERISTICAS DEL MACHO

| | |
|----------------------|--|
| PICO | Mandíbula superior de color bruno; mandíbula inferior de color carne. |
| OJOS | Brunos oscuros. |
| CABEZA | Calota: Bruna muy oscura tirando a negro. Mejillas: Rosas. |
| ESPALDA | Gris claro con reflejos bies. |
| HOMBROS | Gris claro. |
| GARGANTA | Rosa. |
| PECHO | Rosa. |
| FLANCOS | Rosa. |
| VIENTRE | Tirando sobre blanco. |
| ALAS | Remiges primarias: Brunas. Remiges secundarias brunas muy oscuras tirando a negro. Coberteras: Brunas muy oscuras tirando hacia el negro. Banda alar: Gris claro. |
| OBISPILLO | Blanco. |
| COLA | Bruna muy oscura con reflejos metálicos. |
| PATAS Y DEDOS | Brunos muy claros. |
| UÑAS | Brunas. |

DETALLES DE LA COLA.

Todas las rectrices tienen la parte externa bruna muy oscura con reflejos metálicos en la parte interna bruna salvo las dos rectrices medias que son enteramente brunas oscuras con reflejos metálicos.

Vista desde arriba: La cola tiene un aspecto muy oscuro y metálico.

Vista desde abajo: La cola aparece bruna.

DIAMETRO DE LA ANILLA

G: 3,02 mm

DEFECTOS CLASICOS DEL CAMACHUELO BRUNO MACHO.

Pico y patas muy oscuras.

Bruno claro en las alas.

Pico bruno muy claro.

COMPORTAMIENTO HEREDITARIO

Recesivo y ligado al sexo, tanto en el macho como en la hembra.



CAMACHUELO COMUN

MUTACION BRUNA

CARACTERISTICAS DE LA HEMBRA

| | |
|----------------------|--|
| PICO | Mandíbula superior bruna. Mandíbula inferior color carne. |
| OJOS | Bruno oscuro. |
| CABEZA | Calota bruna muy oscura tirando al negro. Mejillas bias brunas. |
| ESPALDA | Beige bruno velada de gris. |
| HOMBROS | Beige brunos velados de gris. |
| GARGANTA | Beige bruno muy uniforme. |
| PECHO | Beige bruno muy uniforme. |
| FLANCOS | Beige bruno muy uniforme. |
| VIENTRE | Claro, tirando al blanco. |
| ALAS | Remiges primarias: Brunas. Remiges secundarias: Brunas muy oscuras tirando al negro. Coberteras: Brunas, muy oscuras tirando al negro. Banda alar gris beige. |
| OBISPILLO | Blanco. |
| COLA | Bruna muy oscura con reflejos metálicos. |
| PATAS Y DEDOS | Brunos muy cálidos. |

UÑAS

Brunas.

DEFECTOS CLASICOS DEL CAMACHELO HEMBRA BRUNA

Pico y patas muy oscura.

Remiges secundarias claras.

Coberteras claras.



CAMACHUELO COMUN

MUTACION BRUNO PASTEL.

CARACTERISTICAS DEL MACHO

| | |
|----------------------|---|
| PICO | Color carne. |
| OJOS | Bruno oscuro. |
| CABEZA | Frente, calota, nuca, loré y mentón: De un bruno avellana cálido. |
| ESPALDA | Gris beige muy claro. |
| GARGANTA | Rojo – rosa. |
| PECHO | Rojo – rosa. |
| FLANCOS | Rojo – rosa. |
| VIENTRE | Región anal: Blanca. |
| ALAS | Remiges primarias: Beige claro. Remiges secundarias y terciarias: Bruno beige. Banda alar: Clara. |
| OBISPILLO | Blanco. |
| COLA | Rectrices: Bruno beige. |
| PATAS Y DEDOS | Color carne. |
| UÑAS | Color bruno. |

DEFECTOS CLASICOS EN EL MACHO

No marcar bien la delimitación del color entre la garganta y el pecho.

PICOS
Mayorista de aves

CAMACHUELO COMUN

MUTACION BRUNO PASTEL

CARACTERISTICAS DE LAHEMBRA

| | |
|----------------------|---|
| PICO | De color carne. |
| OJOS | Bruno oscuro. |
| CABEZA | Frente, calota, nuca, loré y mentón: Bruno claro. |
| ESPALDA | Beige. |
| GARGANTA | Beige, ligeramente tintado de lila. |
| PECHO | Beige, ligeramente tintado de lila. |
| FLANCOS | Beige, ligeramente tintado de lila. |
| VIENTRE | Región anal: Blanca. |
| ALAS | Remiges primarias: Beige claro. Remiges secundarias y terciarias: Bruno beige. Banda alar: Clara. |
| OBISPILLO | Blanco. |
| COLA | Rectrices: Bruno beige. |
| PATAS Y DEDOS | Color carne. |
| UÑAS | Color bruno. |

PICOS
Mayorista de aves

DEFECTOS CLASICOS DE LA HEMBRA

No marcar bien la limitación del color entre la cabeza y el manto.

CARÁCTER HEREDITARIO

Recesivo y ligado al sexo, tanto en el macho como en la hembra.



ESCRIBANO CABECIRROJO

EMBERIZA BRUNICEPS

CARACTERISTICAS DEL MACHO

| | |
|----------------------|--|
| PICO | Negro bruno, variando justo al color corneo. |
| OJOS | Negro brunos. |
| CABEZA | Bruno avellana, desde la base del pico justo hacia la nuca, pasando por la garganta, las mejillas y el alto del pecho. |
| ESPALDA | Amarillo verde, estriado de bruno oscuro. |
| CUELLO | Amarillo verde. |
| PECHO | Delimitado nítido en lo alto del pecho que es bruno avellana y la parte inferior que es amarilla. |
| FLANCOS | Amarillos. |
| VIENTRE | Amarillo. |
| ALAS | Negras brunas, las remiges presentan un ribete blanco sucio. |
| COLA | Negro bruno: Las remiges presentan un ribete blanco sucio. |
| OBISPILLO | Amarillo. |
| PATAS Y DEDOS | De color bruno claro. |
| UÑAS | Color carne. |

DIAMETRO DE LA ANILLA

E: 2,80 mm

DEFECTOS CLASICOS DEL ESCRIBANO CABECIRROJO

Color muy tierno.

Plumaje estropeado.




ESCRIBANO DE CABEZA ROJA

EMBERIZA BRUNICEPS

CARACTERISTICAS DE LA HEMBRA

De color corneo.

| | |
|----------------------|--|
| OJOS | Negros brunos. |
| CABEZA | Gris bruno. |
| ESPALDA | Gris bruno. |
| GARGANTA | Gris bruno. |
| PECHO | Gris bruno. |
| FLANCOS | Gris bruno. |
| VIENTRE | Gris bruno. |
| ALAS | Gris bruno: El ribete de las rectrices son ligeramente mas claras. |
| OBISPILLO | Gris bruno. |
| COLA | Gris bruno: El ribete de las remiges son ligeramente mas claras. |
| PATAS Y DEDOS | Bruno claro. |
| UÑAS | De color corneo. |



GORRION COMUN

MUTACION BRUNO PASTEL

CARACTERISTICAS DEL MACHO

| | |
|------------------------|---|
| PICO | Color carne, amarillento a la raíz del pico. |
| OJOS | Brunos oscuros. |
| CABEZA | Corona: Beige oscuro. Trazos oculares: Brunos. Mejillas: Color crema. |
| ESPALDA | Color bruno claro el cual esta bien repartido sobre el conjunto de la espalda. |
| PECHO Y VIENTRE | Beige. |
| FLANCOS | Beige. |
| ALAS | Escapulares: Bruno claro. Pequeñas coberteras: Bruno claro. Coberteras medianas: Bruno claro, con una banda alar beige claro, la cual tiene que ser bien visible. Grandes coberteras: Bruno claro. Remires secundarias: Claras, con un ribete beige a lo largo de la orilla externa. Remiges primarias: Beige en todo el conjunto. |
| OBISPILLO | Color crema. |
| COLA | Rectrices: Beige, con un ribete claro a lo largo de la orilla externa. |
| PATAS Y DEDOS | De color carne. |
| UÑAS | Color corneo. |

DEFECTOS PRINCIPALES DEL GORRION BRUNO PASTEL

Trazos oculares irregulares.
Barras alares irregulares.
Color de la espalda irregular.

CARÁCTER HEREDITARIO


Recesivo y ligado al sexo.



GORRION COMUN

MUTACION BRUNO PASTEL

CARACTERISTICAS DE LA HEMBRA



| | |
|---|--|
| PICO | De color carne, amarillento en la raíz del pico. |
| OJOS | Brunos oscuros. |
| CABEZA | Corona: Color crema beige. Trazos oculares aun visibles. Mejillas: Color crema beige. |
| ESPALDA | Color crema beige. |
| GARGANTA PECHO FLANCOS Y VIENTRE | Color crema en todo el conjunto. |
| ALAS | Escapulares: Color crema beige. Pequeñas coberteras: Crema beige. Coberteras medianas: Crema beige. Grandes coberteras: Crema beige. Remiges secundarias: Crema beige, con un ribete claro a lo largo de la orilla externa. Remiges primarias: Color crema beige con un ribete claro a lo largo de la orilla externa. |
| OBISPILLO | Color crema. |
| COLA | Color crema beige, con un ribete claro a lo largo de la orilla externa. |
| PATAS Y DEDOS | Color carne. |
| UÑAS | Color corneo. |

PRINCIPALES DEFECTOS DE LA HEMBRA.

Color repartido irregularmente.
Ausencia de ribetes en las alas.



GORRION MOLINERO

MUTACION BRUNO OPAL

CARACTERISTICAS DEL MACHO Y DE LA HEMBRA

| | |
|----------------------|--|
| PICO | Bruno oscuro. |
| OJOS | Brunos negros. |
| CABEZA | Frente, vertex y occipucio: Bruno beige. Mejillas: Gris blanco, con manchas bruno beige. |
| ESPALDA | Manto: Gris blanco, con estrías brunas beige. |
| GARGANTA | Gris blanco, con babero bruno beige. |
| PECHO | Gris blanco, con un ligero velado de gris claro. |
| ALAS | Pequeñas coberteras: Bruno beige. Coberteras medianas y grandes: Gris blanco, con ribete bruno beige. Remiges secundarias: Gris blanco, con un ribete bruno beige. |
| OBISPILLO | Bruno beige. |
| COLA | Rectrices: Gris blanco ligeramente veladas de beige. |
| PATAS Y DEDOS | De color carne. |
| UÑAS | De color carne. |

DEFECTOS CLASICOS DE LOS MACHOS Y HEMBRAS.

Manto demasiado claro.
Dibujos de las mejillas irregulares.

COMPORTAMIENTO HEREDITARIO

Recesivo y autosómico.



ESTORNINO ROSADO

STURNUS ROSEUS.

CARACTERISTICAS DEL MACHO

| | |
|----------------------------------|--|
| PICO | Negro o color plomo desde la base hacia el medio del pico y de color carne o rosa desde el medio a la punta. |
| OJOS | Brunos oscuros. |
| CABEZA Y CUELLO | Negra con reflejos verdes y púrpuras; las plumas de la cúspide de la cabeza son largas y estrechas y se pueden convertir o elevarse como un moño. |
| ESPALDA | De color rosa más pálido o más vivo según la época y la estación: Este color se pierde en cautividad. |
| GARGANTA Y ALTO DEL PECHO | Negro con reflejos púrpuras y verdes. |
| PECHO FLANCOS Y VIENTRE | De color rosa pálido o vivo según la época del año y la estación: Este color se pierde en cautividad. |
| ALAS | Remiges primarias brunas bordeadas en la extremidad de negro violeta. Las remiges secundarias son de color negro verde en el lado externo y bruno en el lado interno, con las tres últimas remiges cerca del cuerpo negras verdes sobre los dos lados. Las coberteras son negras con reflejos verdes y púrpuras. |
| OBISPILLO | De color rosa pálido o fuerte según la época del año o la estación. |
| COLA | De color negro con reflejos verdes y violetas. |
| PATAS Y DEDOS | De color carne más o menos oscuras. |
| UÑAS | De color negruzco. |

CARACTERISTICAS DE LA HEMBRA

La hembra no se diferencia del macho nada mas que por los colores que son menos brillantes y menos vivos, una talla más pequeña y un moño más corto.

DIAMETRO DE LA ANILLA

M 4,52 mm.



ESTORNINO PINTO

MUTACION BRUNA

CARACTERISTICAS DEL MACHO Y DE LA HEMBRA

| | |
|---|---|
| PICO | En verano de color amarillo. En invierno de color corneo pálido. |
| OJOS | Bruno oscuro, con la pupila amarilla bruna. Los ojos no están en el centro de la cabeza, están mas cerca del pico. |
| CABEZA VIENTRE ESPALDA Y FLANCOS | Plumaje bruno oscuro, presentando un dibujo punteado bruno cálido. |
| ALAS | Remiges: Brunas, con un ribete bruno rojo. Coberteras: Bruno oscuro, bordeadas y terminadas de bruno rojo. |
| OBISPILLO | Bruno oscuro, bordeadas de bruno amarillo. |
| COLA | Corta y bruna, bordeada de bruno rojo. |
| BAJO LAS CAUDALES | Bien rellenas, de color brunos con un dibujo típico formado por puntas de flechas blanco sucio. La extremidad de las plumas de debajo de las caudales llegan justo al extremo de la cola. |
| PATAS Y DEDOS | Brunos. |
| UÑAS | De color corneo. |
| HEMBRA | En ella los dibujos punteados son más grandes y más agrupados sobre el vientre. |

OBSERVACIONES

El pico puede a causa de las condiciones, colorearse sobre el amarillo (pasando del color del invierno al color del verano). Esto no es penalizable.

DEFECTOS CLASICOS DEL ESTORNINO MACHO Y HEMBRA

Dibujo demasiado grosero sobre el pecho.
Dibujo debajo de las caudales incompleto e insuficiente.
Los ribetes de las coberteras alares irregulares.
Pecho angulado.
Demasiado manchado.
Reparto irregular en el dibujo punteado.

COMPORTAMIENTO HEREDITARIO

Recesivo y ligado al sexo.



PICOS
Mayorista de aves

ARREDAJO COMUN

MUTACION OPAL

CARACTERISTICAS DEL MACHO Y DE LA HEMBRA

| | |
|------------------------|---|
| PICO | Gris oscuro. |
| OJOS | Azul claro, con circulo ocular gris oscuro. |
| CABEZA | Gris plateado con un velado claro bruno rosa estriado de gris oscuro y se puede elevar en forma de moño. El occipucio: Bruno claro con un reflejo rosa. Dos largos bigotes gris oscuras. |
| ESPALDA | Manto: Blanco plateado, con un reflejo gris claro. |
| GARGANTA | Blanco sucio. |
| PECHO Y FLANCOS | Gris plateado con un reflejo gris claro. |
| ALAS | Remiges primarias: Gris claro, con los extremos gris plateados. Remiges secundarias: Gris claro, con las externas mas claras. El dibujo característico sobre las alas es mas claro, pero el color azul esta aun bien visible. |
| OBISPILLO | Blanco. |
| COLA | Sobre las caudales: gris claro (típico en el opal). Bajo las caudales: Gris oscuras. |
| PATAS Y DEDOS | Color carne oscura. |
| UÑAS | De color corneo claro. |

COMPORTAMIENTO HEREDITARIO

Recesivo y autosómico.

ZORZAL COMUN

MUTACIÓN SATINE

CARACTERISTICAS DEL MACHO Y DE LA HEMBRA

| | |
|-----------------------------------|--|
| PICO | De color carne. |
| OJOS | Rojos oscuros. |
| CABEZA | Color crema claro, con un dibujo escamado sobre el vertex y un reflejo bruno claro sobre las mejillas. |
| ESPALDA | Manto: Color crema claro. |
| GARGANTA | Un bigote bruno claro visible a cada lado de la garganta. Garganta: Color crema claro. |
| PECHO | Color crema con manchas brunas claro en forma de gotas bien repartidas sobre el pecho. |
| FLANCOS | Color crema claro con manchas bruno claro en forma de gotas bien repartidas a los flancos. |
| ALAS | Color crema claro con un dibujo en los hombros y una barra alar bruno claro. |
| OBISPILLO | Color crema claro. |
| COLA | Color crema claro con un dibujo bruno claro visible a las de debajo de las caudales. |
| PATAS DEDOS Y UÑAS | De color carne. |

FALTAS TIPICAS DE LOS MACHOS Y HEMBRAS

Dibujo demasiado poco visible.
Dibujo irregular.

COMPORTAMIENTO HEREDITARIO

Recesivo y ligado al sexo.



RABILARGO

CYANOPICA CYANUS

| | |
|------------------------------|---|
| PICO | Largo (3cm), negro, robusto y con la punta del maxilar superior ligeramente encorvado sobre el inferior. |
| OJOS | Castaño oscuros, con la pupila negra. |
| CABEZA | Siguiendo la comisura del pico y justo hacia la nuca la parte superior y posterior del cuello, totalmente negra, incluyendo los ojos. Estos tienen un ligero cerco ocular bruno oscuro. |
| GARGANTA | Blanco sucio, negras y desde la mitad hasta la extremidad son de un color bruno claro. |
| ESPALDA | El resto la parte interna es negra con la orilla externa azul, esto le da un color azulado a las alas. Continuando la parte posterior – inferior del cuello una línea bruno clara, separando el bruno más oscuro del manto que se continúa hacia el obispillo. Un pequeño ribete bruno claro desde la mitad de las alas hacia el extremo debe de estar visible. |
| PECHO | Desde la garganta que es de color blanco sucio se va oscureciendo en el pecho en un blanco brunáceo hasta la región anal, este color es mas claro que el de la espalda. |
| COLA | La cola de este ejemplar es muy curiosa. Las rectrices externas en ambos lados, la primera es mas corta que la segunda y esta mas corta que la tercera hasta llegar a las medianas que tienen toda su longitud. |
| HOMBROS | De color azul grisáceo. |
| ALAS | La primera remige es mas corta que la segunda, las cinco primeras la orilla externa hasta la mitad tienen un color azul-grisáceo y la cara interna son azulados. El color es negro en su parte inferior y en la superior tiene reflejos azulados. |
| PATAS Y DEDOS | Negros. |
| UÑAS | Negras. |
| TAMAÑO | 34 cm |
| DIAMETRO DE LA ANILLA | 4,5 CM |

HEMBRA

Presenta los mismos colores que el macho, pero en ella son mas pálidos y menos brillantes que el macho.

OBSERVACIONES

Como en todos los córvidos, la inserción del maxilar superior e inferior tienen una cubierta de piel y plumas por delante de la comisura del pico, tapando las fosas nasales, existen unas plumas que semejan a pelos, o bien son pelos pequeños que le dan mas fortaleza al pico.

DEFECTOS CLASICOS DEL RABILARGO MACHO Y HEMBRA

Negro de la cabeza mal delimitado.

Garganta poco nítida aunque en las hembras suele ser más opaca.

Borde de las alas poco nítido o ausente.

Cola desordenada o estropeada.

Pico descarnado o falto plumaje tanto en la parte superior como en la inferior.




Picos



CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS

ANATOMIA DEL PAJARO



1. FRENTE
2. CORONILLA
3. NUCA
4. MEJILLAS O AURICULARES
5. LADO DEL CUELLO
6. NUCA
7. HOMBROS
- 7a. ESCAPULARES
8. DORSO SUPERIOR
9. DORSO INFERIOR
10. OBISPILLO
11. SUPRACORBETERAS CAUDALES
12. COLA
- 12a. RECTRICES EXTERNAS
13. INFRACORBETERAS CAUDALES
14. BAJO VIENTRE
15. VIENTRE
16. FLANCOS
17. PECHO
18. BUCHE
19. GARGANTA
20. MENTON
21. PICO

- I PANTORRILLA
- II PATA
- III DEDOS Y GARRAS
- IV DEDO POSTERIOR

- a. LISTA OCULAR
- b. LISTA SUPERCILIAR
- c. LISTA TESTERA
- d. LISTA VERTICIAR
- e. PILEO
- f. ANILLO OCULAR
- g. BRIDAS

- A. LOMO ALAR
- B. PEQUEÑAS COBERTERAS
- C. MEDIANAS COBERTERAS
- D. GRANDES COBERTERAS
- E. ALULA
- F. TERTIARIAS CUBITAL
- G. SECUNDARIAS
- H. PRIMARIAS